

Paneuropæisk holdningsundersøgelse blandt ME-patienter

Den samlede undersøgelse blev gennemført i 2021 blandt europæiske ME-patienter og er lavet af europæiske EMEA (European ME Alliance) og den norske ME-forening.


Den danske del af undersøgelsen omfatter i alt 481 ME-patienter med følgende profil:

- 399 (83%) har fået diagnosen, 22 (5%) er under udredning for ME og 60 (12%) formoder selv de har ME, men har ikke diagnosen
- 239 (50%) har fået ME af en infektion, 50 (10%) gennem en vaccination, 24 (5%) gennem en operation, ulykke eller tilskadekomst, 22 (4%) gennem en traumatiserende livsbegivenhed, 11 (2%) gennem graviditet eller fødsel, 135 (28%) har fået ME uden det kan knyttes til en enkelt faktor og/eller er udløst af en kombination af de foregående svarmuligheder).
- 415 kvinder (86%), 61 mænd (13%), 5 (1%) har ikke oplyst køn
- Gennemsnitsalderen er omkring 50 år

Symptombillede

”Hvor meget begrænser disse symptomer din evne til at deltage i dagligdagsaktiviteter?”


Antal af respondenter. N=481



Symptombillede

”Hvor meget begrænser disse symptomer din evne til at deltage i dagligdagsaktiviteter?”


Procent af respondenter. N=481



Sygdomsforløb

”Hvordan vil du beskrive dit sygdomsforløb siden starten?”


Antal af respondenter. N= 481



Sygdomsforløb

”Hvordan vil du beskrive dit sygdomsforløb siden starten?”


Procent af respondenter. N=481



Sygdomsudvikling

”Hvordan vil du beskrive din situation igennem det seneste år?”


Antal respondenter. N=481



Sygdomsudvikling

”Hvordan vil du beskrive dit sygdomsforløb siden starten?”


Procent af respondenter. N=481



Sygdomsbelastning

”Hvordan vil du beskrive sværhedsgraden af din sygdom..?”


Antal respondenter. N=481



Sygdomsbelastning

”Hvordan vil du beskrive alvoren af din sygdom..?”


Procent af respondenter. N=481



Diagnostik

Antal år mellem sygdomsudbrud og diagnose


Antal respondenter. N=401



I gennemsnit har de diagnosticerede ventet lidt mere end 9 år på deres diagnose. Medianen er 6 år

Diagnostik

Antal år mellem sygdomsudbrud og diagnose
Procent af respondenter. N=401




I gennemsnit har de diagnosticerede ventet lidt mere end 9 år på deres diagnose. Medianen er 6 år

Komorbiditet

”Har du nogen sygdomme oveni din ME?”

Antal respondenter. N=481




Bemærk: Der er mulighed for at nævne flere komorbiditeter, derfor summer antal respondenter ikke til 481

Komorbiditet

”Har du nogen sygdomme oveni din ME?”

Procent af respondenter. N=481




Bemærk: Der er mulighed for at nævne flere komorbiditeter, derfor summer procentandele summer ikke til 100

Hjælp og støtte fra forskellige aktører


”Hvor meget hjælp og støtte har du modtaget fra disse aktører under dit sygdomsforløb?”

Antal respondenter. N=481



Hjælp og støtte fra forskellige aktører


”Hvor meget hjælp og støtte har du modtaget fra disse aktører under dit sygdomsforløb?” Procent af respondenter. N=481



Effekten af forskellige aktiviteter

”Hvordan synes du, at følgende faktorer har bidraget til sygdomsforløbet?”


Procent af respondenter. N=481



Effekten af forskellige aktiviteter


”Hvordan synes du, at følgende faktorer har bidraget til sygdomsforløbet?”

Procent af respondenter. N=481



Behandlingstyper


”Hvordan synes du, at følgende faktorer har bidraget til sygdomsforløbet?”
Antal respondenter. N=481



Behandlingstyper


”Hvordan synes du, at følgende faktorer har bidraget til sygdomsforløbet?”

Procent af respondenter. N=481



Andre faktorer, der spiller ind på sygdomsforløbet

Antal respondenter. N=481



Andre faktorer, der spiller ind på sygdomsforløbet

Procent af respondenter. N=481

